

2019-nCoV 新型冠狀病毒 (中國武漢肺炎)

# 學生居家檢疫 住宿組同仁須知

成大醫院感染管制中心



國立成功大學  
National Cheng Kung University

# 2019-nCoV 新型冠狀病毒 (中國武漢肺炎)

我國第五類法定傳染病:嚴重特殊傳染性肺炎

**正股RNA病毒**，和 SARS-CoV及 MERS-CoV 都屬於急性呼吸道症候群冠狀病毒 (acute respiratory syndrome coronavirus)

傳染途徑: **飛沫傳染、接觸傳染**

起源: 中國湖北省武漢市

中國及許多亞洲及歐美國家已有多起確診案例



# 「二級流行地區」個案處置流程

## 二級流行地區\*回國者皆須「居家檢疫」

\* 2/6 起中國全區(含港澳)

檢疫期間若有症狀打1922由衛生局轉介醫院採檢  
於醫院swab採檢1次,並照胸部X光

- 若**有**肺炎，入住隔離病室或單人病室，等待檢驗結果。
- 若**無**肺炎，回原居所繼續居家檢疫，等待檢驗結果。
- 若檢驗結果為**陽性**打**1922**由衛生局安排住院隔離；  
若結果為陰性，持續居家檢疫滿14天，除非症狀惡化，無需再二採。



## 名詞解釋

**旅遊史:** 發病前14日內

**發燒定義:** 耳溫至少37.5°C

**接觸史:**

曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，  
包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物  
、體液之直接接觸。



# 住宿組同仁 防護須知



# 測量額溫



- 方式：
  - ✓ 額溫槍置於額頭前約2-5公分
  - ✓ 按壓按鈕測量約1-1.5秒，直至  
嗶聲響或顯現溫度數據。

- 正常額溫35~37.5度

(標準隨不同廠牌而異，必須依據說明書  
換算成中心溫度)

# 洗手步驟七字訣



# 防護裝備



- 中港澳入住者：外科口罩。
- 測量體溫者：外科口罩。
- 住宿服務人員於宿舍活動：外科口罩。



- 清潔人員：非連身型防護衣。
- 清潔人員：要執行碰水的清潔，  
建議穿與雨鞋或防水鞋套。



# 配戴外科口罩(耳掛式)



1.綠色面朝外，壓條朝上方。



2.將口罩掛於雙耳後，並上下拉順。



3.按壓壓條，緊貼鼻樑線條。



4.完成後再次確認口罩覆蓋口鼻、下巴完整性。

- 以單次使用為原則
- 潮濕需立即更換
- 不可掛於脖子上



# 如何脫除口罩(耳掛式)

- ✓ 先執行洗手
- ✓ 雙手拉住掛於耳後之彈性繩
- ✓ 不碰觸口罩外側污染面，將口罩取下
- ✓ 將脫下的口罩丟入專用垃圾桶中



# 防護裝備步驟-穿戴

1



洗手

2



戴外科口罩

3



佩戴髮帽

## 防護裝備步驟-穿戴

4



戴護目鏡  
(眼鏡)

5



穿隔離衣

6



穿短手套  
需套在隔離衣內層

7



穿長手套  
需包覆隔離衣



# 防護裝備步驟-穿戴

8



完成

視情況穿雨鞋或鞋套

## 防護裝備步驟-脫除

1



脫長手套

2



脫防護目鏡  
或眼鏡


3



脫除隔離衣  
由外向內捲



## 防護裝備步驟-脫除



脫除短手套



洗手



脫除髮帽

# 環境清潔-漂白水泡製

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| 濃度            | 500ppm |        |
| 漂白水<br>(5-6%) | 50c.c  | 4950ml |



漂白水  
量測工具

固定刻度  
(4950ml)



- 執行清消工作時，應先以清水移除髒污後，再使用漂白水或75%酒精，執行環境清消。
- 環境清潔消毒必須由低污染區開始 -> 重污染區。
- 使用完拖把、抹布，需以漂白水浸泡10分鐘，進行消毒。

# 居家檢疫/隔離廢棄物處理

- 居家檢疫/隔離時所產出的垃圾，遵守廢棄物處理原則，應丟棄於適當的容器或袋子，適當綑綁並確保不會溢出或滲漏。
- 不需垃圾分類。
- 處理廢棄物的人員，應依建議穿戴適當的個人防護裝備。
- 確實使用漂白水進行相關環境清潔。
- 廢棄物遵循環保署規範辦理，通知當地清潔隊俾利安排前往收集，不要隨一般垃圾排出。

